

## 腸病毒防治查核重點

機構別	重點事項
教托育機構	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 洗手環境與行為                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 是否於洗手台放置適當數量之洗手乳或肥皂、乾淨毛巾或擦手紙</li> <li>(2) 是否衛教學童瞭解正確洗手步驟</li> <li>(3) 學童洗手動作是否正確</li> <li>(4) 學童是否認知正確洗手時機</li> </ol> </li> <li>2. 環境清消                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 是否能正確配製500ppm漂白水</li> <li>(2) 是否定期環境清潔及重點消毒<sup>註</sup></li> <li>(3) 是否製作清消紀錄</li> </ol> </li> <li>3. 防疫機制                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 是否建立學童健康監視記錄</li> <li>(2) 是否確實瞭解縣市之腸病毒疫情與停課通報機制並依循運作</li> <li>(3) 是否知道如何查詢宣導資料</li> <li>(4) 是否張貼宣導資料</li> <li>(5) 是否實施家長衛教</li> </ol> </li> </ol>
嬰幼兒及學童常出入之公共場所（如遊樂區、百貨賣場、餐廳等）	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 洗手環境                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 是否於洗手台放置適當數量之洗手乳或肥皂、擦手紙</li> <li>(2) 是否張貼正確洗手步驟宣導資料</li> </ol> </li> <li>2. 環境清消                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 是否能正確選用消毒劑<sup>註</sup>，請宣導正確配製500ppm漂白水方法</li> <li>(2) 是否針對遊戲區、電梯、手扶梯、手推車、洗手間實施定期（時）消毒</li> <li>(3) 是否製作消毒紀錄</li> </ol> </li> </ol>
醫療機構	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 洗手環境                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 是否於洗手台放置洗手乳或肥皂、擦手紙</li> <li>(2) 是否張貼正確洗手步驟宣導資料</li> </ol> </li> <li>2. 環境清消                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 是否能正確配製500ppm漂白水</li> <li>(2) 是否針對遊戲區、電梯、手扶梯、洗手間實施定期（時）消毒<sup>註</sup></li> </ol> </li> <li>3. 衛教宣導                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 是否張貼腸病毒宣導海報或資料</li> <li>(2) 醫師是否對腸病毒病童家長進行重症前兆病徵衛教</li> </ol> </li> <li>4. 疑似重症個案處置機制                             <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 是否提供醫護人員相關宣導訊息（如轉知本署相關公文、新聞稿、致醫界通函等）</li> <li>(2) 是否明確建立轉診機制且相關醫護人員皆明瞭</li> <li>(3) 若為腸病毒重症責任醫院，聯繫窗口是否隨時保持暢通</li> </ol> </li> </ol>
居家	<p>衛教宣導</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 照顧者是否知道正確洗手步驟及時機</li> <li>(2) 照顧者是否知道「生病不上學」之防疫概念</li> <li>(3) 是否知道漂白水為最簡單有效之消毒方法，並宣導正確配製500ppm漂白水方法</li> <li>(4) 照顧者是否知道4項重症前兆病徵：「嗜睡、意識不清、活力不佳、手腳無力」、「<b>肌攣型抽搐（無故驚嚇或突然間全身肌肉收縮）</b>」、「持續嘔吐」與「呼吸急促或心跳加快」等</li> <li>(5) 是否知道出現重症前兆病徵時，應立即送大醫院，可掌握治療的黃金時間</li> </ol>

註：使用500ppm漂白水或其他具檢驗報告可證實對腸病毒有效之消毒藥品。